

# ИНСТРУКЦИЯ

## по медицинскому применению препарата

### ДЕПАНТОЛ®

**Регистрационный номер:** ЛСР-001794/08

**Торговое название препарата:** Депантол®

**Международное непатентованное название или группировочное название:**

Декспантенол+Хлоргексидин&

**Лекарственная форма:** Крем для наружного применения

#### **Состав**

1 г крема содержит: в качестве активного вещества – D-Пантенол (декспантенол) – 0,0525 г; хлоргексидина биглюконат – 0,00802 г и вспомогательных веществ (пропиленгликоль, макрогола-20-цетостеарат (цетостеариловый эфир макрогола 20), цетостеариловый спирт, масло вазелиновое медицинское (парафин жидкий), вазелин (парафин мягкий), натрия гидрофосфата додекагидрат, калия дигидрофосфат, вода очищенная) – до 1 г.

**Описание:** Крем белого или почти белого цвета.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Стимулятор репарации тканей.

**Код АТХ:** D08AC52.

#### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат. Декспантенол – витамин группы В, в организме метаболизируется в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, глюкокортикостероидов, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, витаминное, метаболическое и противовоспалительное действие. Хлоргексидин – противомикробный препарат, является антисептическим средством. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Staphylococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *E.coli*, *Streptococcus spp.*, а также дрожжеподобных грибов и дерматофитов. Сохраняет активность в присутствии крови, гноя, различных секретов и органических веществ.

Крем Депантол® защищает поверхность раны от инфекций, подавляет течение инфекционного процесса и ускоряет заживление.

#### **Показания к применению**

Лечение и профилактика инфицированных повреждений кожи:

- для обработки ран при опасности инфицирования (ссадин, порезов, царапин, трещин, расчесов, в том числе после укусов насекомых, ожогов, трофических язв);
- для обработки послеоперационных ран;
- для лечения инфицированных ран, ожогов (в том числе солнечных), пролежней, ссадин,

порезов, трещин, трофических язв, опрелостей;

– для лечения инфицированных дерматозов (в том числе экземы и атопического дерматита).

У детей также применяют при пеленочном дерматите, царапинах с признаками инфицирования.

У кормящих матерей – при трещинах и воспалении сосков молочных желез с признаками инфицирования.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы**

Наружно. Крем наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 1 или несколько раз в сутки по показаниям. Кормящим матерям смазывать кремом инфицированную поверхность соска после кормления грудью. Грудным детям наносят на места инфицирования после смены белья или водной процедуры.

## **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

## **Взаимодействие**

Хлоргексидин не совместим с мылом и другими анионными веществами.

## **Особые указания**

Не допускать попадания в глаза. При беременности и лактации следует избегать применения на обширных участках.

## **Форма выпуска**

Депантол® крем для наружного применения по 25, 30 или 50 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещается в пачку из картона.

## **Срок годности**

2 года. Не применять препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

## **Производитель**

ОАО «Нижфарм», Россия.

## **Претензии потребителей направлять по адресу:**

603950, г. Нижний Новгород,

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278 80 88, факс: (831) 430 72 28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>